

viridon® HPB

TADALAFILO
TAMSULOSINA HCl

hiperplasia prostática benigna

- **viridon® 5 mg** tabletas
- **taprost® 0.4 mg** cápsulas de liberación prolongada

CONOCIENDO viridon® HPB

viridon® HPB es una combinación de **viridon® 5 mg tabletas**, el cual contiene como principio activo Tadalafilo, un inhibidor selectivo y potente de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), y **taprost® 0.4 mg cápsulas de liberación prolongada**, el cual contiene como principio activo Tamsulosina HCl, un antagonista selectivo de los receptores adrenérgicos α_1 y α_{1D} .

El uso combinado de ambos productos es utilizado para el tratamiento de los síntomas funcionales de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), debido a que el Tadalafilo produce la relajación del músculo liso de la próstata y la vejiga, así como también produce un aumento de la perfusión sanguínea a través de su vascularización, logrando con estos mecanismos la reducción de los síntomas, mientras que la Tamsulosina HCl favorece la relajación del músculo liso de la próstata y la uretra, facilitando la micción, disminuyendo el goteo y la necesidad de orinar frecuentemente.

QUÉ CONTIENE viridon® HPB

Cada tableta de **viridon® 5 mg** contiene:

Tadalafilo 5 mg

Excipientes c.s.

Cada **cápsula de liberación prolongada de taprost® 0.4 mg** contiene:

Tamsulosina HCl 0.4 mg

Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO viridon® HPB

viridon® HPB está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas funcionales de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) en hombres adultos.

CÓMO SE PRESENTA viridon® HPB

viridon® HPB se presenta en caja con 30 y 40 tabletas de **viridon® 5 mg**, y con 30 y 40 cápsulas de liberación prolongada de **taprost® 0.4 mg**, contenidas en burbujas de blíster de PVC/PVDC que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presenta la dosis promedio usual:

Adultos

Tadalafilo 5 mg (1 tableta) + tamsulosina HCl 0.4 mg (1 cápsula) una vez al día, después del desayuno o de la primera comida del día.

ADVERTENCIAS

- Su uso debe ser bajo estricta vigilancia médica.
- Antes de iniciar el tratamiento con **viridon® HPB**, debe de ser examinado para descartar la presencia de otras patologías que puedan originar los mismos síntomas que la hiperplasia prostática benigna.
- Antes de iniciar el tratamiento, debe informarle a su médico si padece de anemia falciforme, mieloma múltiple, leucemia o cualquier deformación del pene.
- No debe de ingerir alcohol durante su uso, ya que este puede incrementar el potencial para producir signos y síntomas ortostáticos incluyendo un incremento en las pulsaciones, disminución en la presión arterial ortostática, mareos y cefaleas.
- Suspenda su uso y busque ayuda médica, si presenta pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos, y en caso de disminución o pérdida de la audición.

PRECAUCIONES

- En caso de padecer daño hepático leve o moderado el médico debe ajustarle la dosis.
- En caso de daño renal con depuración de creatinina de 30-50 mL/min la dosis no debe exceder a 5 mg cada 72 horas.
- Se debe utilizar con precaución en pacientes geriátricos, debido a su alta sensibilidad.
- Debido a que se han presentado casos de mareos, se debe de considerar su uso al momento de conducir o utilizar maquinaria.
- No consumir alcohol durante su uso.

CONTRAINDICACIONES

El uso de **viridon® HPB** está contraindicado en las siguientes condiciones:

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los componentes de la fórmula.
- Si ha presentado angina inestable.
- Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio en los últimos 90 días.
- Pérdida de la visión en un ojo a consecuencia de una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), descrita como "infarto del ojo".
- Arritmias incontroladas, hipotensión (< 90/50 mm Hg) o hipertensión no controlada.
- Accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses.
- No se recomienda su uso si es diabético o presenta daño hepático severo.
- En niños o adolescentes menores de 18 años.

INTERACCIONES

Interacciones que afectan a otros medicamentos

- Tadalafilo potencia el efecto hipotensor de los nitratos.
- La interacción de Tamsulosina con $\alpha 1$ -bloqueadores y antihipertensivos produce hipotensión.

Interacciones que afectan a **viridon® HPB**

- Inhibidores del citocromo CYP3A4: Aumentan la exposición al Tadalafilo y a la Tamsulosina HCl.
- Inductores del citocromo CYP3A4: Disminuyen la eficacia del Tadalafilo y Tamsulosina HCl.
- Los inhibidores de la proteasa incrementan la exposición al Tadalafilo.
- Los antiácidos provocan reducción de la absorción del Tadalafilo.
- El diclofenaco o la warfarina, pueden aumentar la velocidad de eliminación de Tamsulosina HCl.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos, **viridon® HPB** también puede presentar efectos adversos, entre los más comunes están: dolor de cabeza, indigestión o acidez estomacal, hipotensión, hiperemia ocular, náuseas, mareo, rubor, congestión nasal, dolor de estómago, espalda, músculos, brazos o piernas y alteraciones de la eyaculación incluyendo eyaculación retrógrada e insuficiente.

USO ADECUADO DE **viridon® HPB**

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **viridon® HPB** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com