

Resfriolito®

PEDIÁTRICO

LORATADINA Y ACETAMINOFÉN

antialérgico, reduce la fiebre y alivia el dolor

Jarabe

CONOCIENDO Resfriolito® Pediátrico

Resfriolito® Pediátrico jarabe es un medicamento que combina dos principios activos: la **Loratadina** es un antihistamínico de acción prolongada, que ayuda a aliviar el prurito, estornudos, congestión y goteo nasal, sin producir sueño y el **Acetaminofén** posee efecto analgésico (alivia el dolor) así como antipirético (reduce la fiebre).

QUÉ CONTIENE Resfriolito® Pediátrico

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Loratadina 0.83 mg

Acetaminofén 150 mg

Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO Resfriolito® Pediátrico

Resfriolito® Pediátrico jarabe es un medicamento indicado para tratar los síntomas del resfriado común, gripe y rinitis alérgica también conocido como alergia estacional: rinorrea, flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo.

COMO SE PRESENTA Resfriolito® Pediátrico

Resfriolito® Pediátrico jarabe se presenta en caja conteniendo un envase con 60 mL de jarabe, cucharita dosificadora y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes.

Siga las indicaciones que le de su médico.

A continuación, la dosis promedio usual:

Dosis	
Niños de 2 a 3 años	5 mL cada 8 horas
Niños de 4 a 5 años	7.5 mL cada 8 horas
Niños de 6 a 8 años	10 mL cada 8 horas

No exceder la dosis recomendada.

ANTES DE USAR Resfriolito® Pediátrico LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los ingredientes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otra medicina o comida.
- Está contraindicado en pacientes con glaucoma ángulo estrecho, retención urinaria, hipertensión grave, enfermedad coronaria severa, hipertiroidismo, úlcera péptica, granulomatosis y diabetes mellitus.
- El uso concomitante con ketoconazol, eritromicina y cimetidina se ha reportado aumento en las concentraciones de loratadina.
- Los pacientes con función hepática alterada se debe administrar inicialmente una dosis menor, ya que estos pacientes pueden tener una depuración de loratadina más lenta.
- El Acetaminofén puede potenciar el efecto de los anticoagulantes cuando se usan dosis superiores a los 2g/día.
- A dosis recomendada no afecta el período de embarazo y lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, generalmente están relacionados con la dosis y la duración del tratamiento. Normalmente éstos pueden revertirse o reducirse al mínimo por medio de una reducción de la dosis lo que generalmente es preferible a la suspensión del tratamiento farmacológico.

USO ADECUADO DE Resfriolito® Pediátrico

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome este medicamento durante todo el tiempo del tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal.
- No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protégase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta libre

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

