

glifoglu®

DAPAGLIFLOZINA

- **Antidiabético**
- **Cardioprotector**
- **Nefroprotector**

Tabletas recubiertas

CONOCIENDO glifoglu®

glifoglu® 10 mg tabletas recubiertas contiene como principio activo Dapagliflozina un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa 2 (SGLT2), que funciona bloqueando la proteína SGLT2 en el riñón. Al bloquear esta proteína, la glucosa en sangre, el sodio y agua se eliminan del cuerpo a través de la orina.

QUÉ CONTIENE glifoglu®

Cada tableta recubierta de **glifoglu® 10 mg** contiene:
Dapagliflozina propanodiol monohidrato 12,30 mg
Equivalente a Dapagliflozina 10,00 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO glifoglu®

glifoglu® 10 mg tabletas recubiertas está indicado para tratar la diabetes tipo 2, cuando no se puede controlar con la dieta y el ejercicio. En insuficiencia cardíaca en adultos cuando el corazón no bombea la suficiente sangre y en adultos con enfermedad renal crónica (función renal reducida).

CÓMO SE PRESENTA glifoglu®

glifoglu® 10 mg tabletas recubiertas, se presenta en caja con 30 y 45 tabletas recubiertas contenidas en burbujas de blíster de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos: tomar una tableta recubierta de 10 mg al día. El médico podría indicar una dosis distinta según las condiciones de cada paciente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Cuando se está en tratamiento con **glifoglu®** podría incrementarse el riesgo de una cetoacidosis diabética aún cuando la glucosa en sangre sea normal. Si sospecha que tiene una cetoacidosis diabética (experimenta náuseas o vómitos, dolor de estómago, sed excesiva, respiración rápida y profunda, confusión, somnolencia o cansancio poco habitual, olor dulce en su aliento, un sabor dulce o metálico en la boca, o un olor diferente en su orina o sudor, o una pérdida de peso rápida), contacte a su médico

o acuda al hospital más cercano de inmediato y no tome el medicamento.

- Contiene Tartrazina, no administrar a personas alérgicas a la Tartrazina.
- Consulte a su médico de forma inmediata si presenta una combinación de síntomas tales como: dolor a la palpación, enrojecimiento o inflamación de los genitales o de la zona entre los genitales y el ano, fiebre o malestar general, ya que podrían ser signos de una infección seria e incluso potencialmente mortal, denominada fascitis necrosante del perineo o gangrena de Fournier que destruye el tejido bajo la piel y que debe ser tratada inmediatamente.
- Indíquelo a su médico si tiene diabetes y algún problema de riñón, ya que puede prescribirle un medicamento adicional u otro distinto que controle el nivel de glucosa en sangre.
- Si tiene niveles muy altos de glucosa en sangre **glifoglu®** puede provocar deshidratación, informe inmediatamente a su médico si presenta algún síntoma como náuseas, vómitos o fiebre o no es capaz de comer o beber.
- Debido a cómo actúa la Dapagliflozina, es posible que su orina de positivo en glucosa mientras este tomando **glifoglu®**.
- Informe a su médico si está tomando medicamentos diuréticos, sulfonilureas y litio.

CONTRAINDICACIONES

- Si presenta infecciones urinarias a menudo, no tome **glifoglu®**.
- No se recomienda el uso de **glifoglu®** en niños ni adolescentes menores de 18 años para el tratamiento de insuficiencia cardíaca o para el tratamiento de enfermedad renal crónica.
- No se recomienda el uso de **glifoglu®** en niños menores de 10 años para el tratamiento de diabetes tipo 2.

INTERACCIONES

- No administrar en conjunto con medicamentos diuréticos, ya que estos eliminan líquido del organismo y pueden provocar deshidratación.
- Dosis altas de Dapagliflozina con insulina o medicamentos tipo sulfonilurea, pueden provocar hipoglucemia (una disminución rápida de niveles de glucosa en sangre).
- **glifoglu®** puede reducir la cantidad de litio en sangre.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos **glifoglu®** también puede presentar efectos adversos, entre los más comunes están: infecciones genitales (candidiasis) del pene o la vagina (los signos pueden incluir irritación, picor, flujo u olor anormal), dolor de espalda, mayor cantidad de orina de lo normal o necesidad de orinar más frecuentemente, cambios en los niveles de colesterol o lípidos en la sangre, aumentos en la cantidad de glóbulos rojos en sangre, disminuciones en el aclaramiento renal de creatinina al iniciar el tratamiento, mareos y erupción.

COMUNICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en los descritos en esta información. También puede comunicarlos directamente a través del Programa de Farmacovigilancia de Medicamentos. Gracias a la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Datos de contactos:

farmacovigilancia.gt@gmail.com
farmacovigilancia@donovanwerke.com

USO ADECUADO DE glifoglu®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

Última Revisión 29/05/2025

COD. 53215 V.0020525



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com