

polieticol®

POLIETILENGLICOL 3350

Tratamiento del estreñimiento ocasional y crónico **Laxante osmótico**

polieticol® 10 g polvo para solución oral
polieticol® 17 g polvo para solución oral

CONOCIENDO polieticol®

polieticol® polvo para solución oral es un medicamento que contiene Polietilenglicol 3350, un tipo de laxante osmótico que funciona atrayendo agua hacia el intestino, lo que hace que las heces se vuelvan más blandas y fáciles de eliminar. Al aumentar la cantidad de agua en el intestino, también se incrementa la presión dentro del mismo. Esto ayuda a que los músculos del intestino se muevan y empujen las heces hacia afuera. Como resultado de estas acciones, el tránsito intestinal se vuelve más natural y sin esfuerzo.

QUÉ CONTIENE polieticol®

Cada sobre de 10 g de polvo para solución oral contiene:
Polietilenglicol 3350 10g

Cada sobre de 17 g de polvo para solución oral contiene:
Polietilenglicol 3350 17g

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO polieticol®

polieticol® está indicado en el tratamiento del estreñimiento ocasional o crónico, cuando no se evacúan las heces con la frecuencia o facilidad habitual y en el tratamiento de la impactación fecal, afección grave en la que una masa de heces secas y duras bloquea el colon o el recto.

CÓMO SE PRESENTA polieticol®

polieticol® polvo para solución oral se presenta en caja con 15 sobres de aluminio-papel conteniendo 10 g de polvo cada uno, y el presente inserto.

polieticol® polvo para solución oral se presenta en caja con 15 sobres de aluminio-papel conteniendo 17g de polvo cada uno, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para cada paciente. Siga las instrucciones que le dé su médico.

A continuación, se presenta la dosis promedio usual:

Dosis adultos y niños con peso igual o superior a 17 kg:
1 sobre de 17 g una vez al día.

Dosis niños con peso inferior a 17 kg:

1 sobre de 10 g una vez al día, o la cantidad equivalente a la dosis recomendada de 0.5 a 1.5 g/kg/día, con un máximo de 17 g por día, según las indicaciones del médico.

Forma de preparación

Disolver el contenido de un sobre en 250 mL de agua (hervida o purificada), jugo o refresco. Asegurarse que el polvo esté completamente disuelto y beber inmediatamente.

PRECAUCIONES

- Para lograr la evacuación intestinal puede ser necesario el tratamiento durante dos a cuatro días. El uso no debe exceder más de dos semanas, a menos que lo indique su médico.
- Consulte a su médico antes de usar este producto si experimenta un cambio repentino en sus hábitos intestinales que duren más de 2 semanas o si padece síndrome del intestino irritable o si presenta síntomas como náusea, vómitos o dolor abdominal.
- El uso frecuente y prolongado de este producto u otro laxante puede crear hábito.
- Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico antes de usar este producto.

ADVERTENCIAS

- Suspenda su uso y consulte a su médico si tiene sangrado rectal, náuseas, distensión abdominal, cólicos o dolor abdominal, ya que estos pueden ser signos de una afección grave.
- No se recomienda usar este producto si tiene fiebre.

CONTRAINDICACIONES

- Antecedentes de hipersensibilidad (reacciones alérgicas) al Polietilenglicol 3350.
- No lo use si padece enfermedad renal, excepto bajo el consejo y supervisión de un médico.
- Diagnóstico o sospecha de obstrucción intestinal, íleo, estenosis sintomática.
- Afecciones inflamatorias graves del intestino (como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y megacolon tóxico).
- Perforación o riesgo de perforación intestinal.
- Dolor abdominal de causa indeterminada.

INTERACCIONES

- No se han reportado interacciones específicas de Polietilenglicol 3350 con otros medicamentos.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios comunes de la administración oral de Polietilenglicol 3350 incluyen flatulencia, náuseas, calambres estomacales, diarrea, abdomen hinchado y hemorragia rectal.

USO ADECUADO DE polieticol®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.

- Tome **polieticol**® durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

